



KTH Teknikvetenskap

**SF1624 Algebra och geometri**  
**Onsdagen 10 juni, 2015**

Skrivtid: 08:00-13:00

Tillåtna hjälpmedel: inga

Examinator: Roy Skjelnes

Tentamen består av nio uppgifter som vardera ger maximalt fyra poäng.

Del A på tentamen utgörs av de tre första uppgifterna. Till antalet erhållna poäng från del A adderas dina bonuspoäng. Poängsumman på del A kan dock som högst bli 12 poäng. Bonuspoängen beräknas automatiskt. Antal bonuspoäng framgår från resultatsidan.

De tre följande uppgifterna utgör del B och de tre sista uppgifterna del C, som främst är till för de högre betygen.

Betygsgränserna vid tentamen kommer att ges av

Betyg	A	B	C	D	E	Fx
Total poäng	27	24	21	18	16	15
varav från del C	6	3	–	–	–	–

För full poäng på en uppgift krävs att lösningen är väl presenterad och lätt att följa. Det innebär speciellt att införda beteckningar ska definieras, att den logiska strukturen tydligt beskrivs i ord eller symboler och att resonemangen är väl motiverade och tydligt förklarade. Lösningar som allvarligt brister i dessa avseenden bedöms med högst två poäng.

*Var god vänd!*

## DEL A

1. Betrakta följande punkter i rummet:

$$A = (-1, 0, 1), B = (1, 1, 2) \quad \text{och} \quad C = (0, 0, 2).$$

- (a) Ange en parametrisk ekvation för linjen  $l$  som går genom  $B$  och  $C$ . **(1 p)**
- (b) Bestäm en ekvation (normalform) för planet  $\pi$  som går genom  $A$  och är ortogonalt mot  $l$ . **(1 p)**
- (c) Bestäm avståndet mellan  $A$  och linjen  $l$ . **(2 p)**

2. Till varje tal  $a$  har vi matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2a+2 & -2a-4 \end{bmatrix}.$$

- (a) För vilka  $a$  är matrisen  $A$  inverterbar? **(2 p)**
- (b) Låt  $a = 3$ , och bestäm inversen till  $A$ . **(2 p)**

3. Låt  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  vara den linjära avbildningen

$$T(x, y, z) = (x + 2y + z, 2x + y - z, -3x - y + 2z).$$

- (a) Bestäm matrisrepresentation för avbildningen  $T$ . **(1 p)**
- (b) Bestäm en bas för nollrummet,  $\ker(T)$ . **(1 p)**
- (c) Bestäm dimensionen till bildrummet till  $T$ . **(1 p)**
- (d) Låt  $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ . Bestäm någon annan punkt  $Q$  sådan att  $T(P) = T(Q)$ . **(1 p)**

## DEL B

4. Betrakta matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}.$$

- (a) Bestäm ett egenvärde som har två linjärt oberoende egenvektorer. **(2 p)**  
 (b) Ange alla egenvärden och avgör om matrisen  $A$  är diagonaliserbar. **(2 p)**

5. Låt  $V$  vara det linjära höljet till vektorerna  $\begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  och  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ , och låt  $V^\perp$  beteckna dess ortogonala komplement.

- (a) Bestäm en bas för  $V^\perp$ . **(2 p)**  
 (b) Låt  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  vara speglingen i  $V$ , dvs  $T(\vec{x}) = \vec{x}$  om  $\vec{x}$  är i  $V$ , och  $T(\vec{x}) = -\vec{x}$

om  $\vec{x}$  är i  $V^\perp$ . Bestäm  $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$ . **(2 p)**

6. Bestäm en symmetrisk matris  $A$  som satisfierar följande.

- (a) Egenrummet tillhörande egenvärdet  $\lambda = 2$  är  $[2t \ t \ -t]^T$ , godtyckliga tal  $t$ .  
 (b) Egenrummet tillhörande egenvärdet  $\lambda = 4$  har dimension två. **(4 p)**

*Var god vänd!*

## DEL C

7. Bestäm den räta linje  $L$  som går genom punkten  $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , och som skär de båda linjerna (4 p)

$$L_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 3t \\ t \\ t+1 \end{bmatrix} \mid \text{tal } t \right\} \quad \text{och} \quad L_2 = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ s+4 \\ 2s \end{bmatrix} \mid \text{tal } s \right\}.$$

8. Låt  $V_1 \subset V_2 \subset \dots \subset V_n = \mathbb{R}^n$  vara en uppsättning delrum till  $\mathbb{R}^n$  sådana att  $V_k$  har dimension  $k$  för varje  $k$  och  $V_{k-1}$  är ett delrum till  $V_k$  för varje  $k \geq 2$ . En sådan uppsättning delrum kallas en *flagga*. Låt  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  vara en linjär avbildning som *stabiliserar* flaggan. Med det menas att för varje  $k = 1, 2, \dots, n$  och för varje vektor  $v \in \mathbb{R}^n$  gäller implikationen  $v \in V_k \Rightarrow T(v) \in V_k$ . Låt nu  $v_1, v_2, \dots, v_n$  vara vektorer i  $\mathbb{R}^n$  sådana att  $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\} = V_k$  för varje  $k$ . Visa att matrisen för  $T$  med avseende på basen  $v_1, v_2, \dots, v_n$  är övertriangulär. (4 p)

9. Matrisen

$$A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 8 & 0 \\ 5 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

har egenvektorer  $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$  med tillhörande egenvärden

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{7 + \sqrt{57}}{20}, \quad \text{och} \quad \lambda_3 = \frac{7 - \sqrt{57}}{20}.$$

- Låt  $X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$  vara en vektor med positiva koefficienter  $a \geq 0, b \geq 0$  och  $c \geq 0$  sådana att  $a + b + c = 1$ . Bestäm punkten  $A^n X$ , när  $n \rightarrow \infty$ . (4 p)



**SF1624 Algebra och geometri**  
**Lösningsförslag till tentamen 2015.06.10**

DEL A

1. Betrakta följande punkter i rummet:

$$A = (-1, 0, 1), B = (1, 1, 2) \quad \text{och} \quad C = (0, 0, 2).$$

- (a) Ange en parametrisk ekvation för linjen  $l$  som går genom  $B$  och  $C$ . **(1 p)**
- (b) Bestäm en ekvation (normalform) för planet  $\pi$  som går genom  $A$  och är ortogonalt mot  $l$ . **(1 p)**
- (c) Bestäm avståndet mellan  $A$  och linjen  $l$ . **(2 p)**

**Lösningsförslag.**

- (a) Linjen  $l$  som går genom  $B$  och  $C$  har vektorn  $\vec{BC} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  som riktningsvektor.

Linjen går t.ex. genom  $B$  och har

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

som parametrisk ekvation.

- (a) Eftersom planet är ortogonalt mot  $l$  är riktningsvektorn  $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  en normalvektor till planet. Dessutom går planet genom  $A$ . Ekvationen blir då

$$(-1) \cdot (x - (-1)) + (-1) \cdot (y - 0) + 0 \cdot (z - 1) = 0, \quad \text{d.v.s.} \quad x + y + 1 = 0.$$

- (b) Eftersom planet är ortogonalt mot  $l$  är det eftersökta avståndet lika med avståndet mellan  $A$  och  $P$ , där  $P$  är skärningspunkten mellan planet och linjen.

$$l \cap \pi = \left\{ \begin{pmatrix} -t+1 \\ -t+1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ så att } -t+1 - t+1 + 1 = 0 \right\}.$$

Det följer att  $t = \frac{3}{2}$  och  $P = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 2 \end{pmatrix}$ . Avståndet blir alltså

$$d(A, P) = \|\vec{AP}\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

2. Till varje tal  $a$  har vi matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2a+2 & -2a-4 \end{bmatrix}.$$

- (a) För vilka  $a$  är matrisen  $A$  inverterbar? (2 p)  
 (b) Låt  $a = 3$ , och bestäm inversen till  $A$ . (2 p)

### Lösningförslag.

(a) Genom att addera multipler av den första raden till den andra och den tredje får vi

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2a+2 & -2a-4 \end{bmatrix} &= \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & 2 & -a \\ 0 & 2a & -4 \end{bmatrix} \\ &= 1 \det \begin{bmatrix} 2 & -a \\ 2a & -4 \end{bmatrix} \\ &= 2(-4) - 2a(-a) \\ &= 2(a^2 - 4). \end{aligned}$$

Determinanten  $\det(A)$  är alltså noll om  $a = \pm 2$ , så  $A$  är inverterbar för alla  $a$  förutom dessa värden.

(b) Då  $a = 3$  är

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 8 & -10 \end{bmatrix}.$$

Genom radoperationer har vi

$$\begin{aligned} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 8 & -10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -4 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -5 & -3 & 1 \end{array} \right] \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -2 & -9/5 & 3/5 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & -4/5 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3/5 & 1/5 \end{array} \right] \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -7/5 & 3/10 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2/5 & 3/10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3/5 & 1/5 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Så våran kandidat till invers är

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -7/5 & 3/10 \\ -1 & -2/5 & 3/10 \\ -1 & -3/5 & 2/10 \end{bmatrix}.$$

Vi gör en kontroll

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 8 & -10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -7/5 & 3/10 \\ -1 & -2/5 & 3/10 \\ -1 & -3/5 & 2/10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 - 1 + 3 = 1 & \frac{-7-2+9}{5} = 0 & \frac{3+3-6}{10} = 0 \\ 1 - 1 = 0 & \frac{7-2}{5} = 1 & \frac{-14-16+30}{10} = 0 \\ \frac{3+3-6}{10} = 0 & \frac{-3+3}{10} = 0 & \frac{6+24-20}{10} = 1 \end{bmatrix}.$$

**Svar.**



3. Låt  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  vara den linjära avbildningen

$$T(x, y, z) = (x + 2y + z, 2x + y - z, -3x - y + 2z).$$

- (a) Bestäm matrisrepresentation för avbildningen  $T$ . **(1 p)**  
 (b) Bestäm en bas för nollrummet,  $\ker(T)$ . **(1 p)**  
 (c) Bestäm dimensionen till bildrummet till  $T$ . **(1 p)**  
 (d) Låt  $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ . Bestäm någon annan punkt  $Q$  sådan att  $T(P) = T(Q)$ . **(1 p)**

### Lösningförslag.

(a) Vi har

$$T \left( \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} x + 2y + z \\ 2x + y - z \\ -3x - y + 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

så matrisrepresentationen för avbildningen  $T$  är

$$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(b) Gauss-Jordan-elimination överför  $M_T$  till trappform som

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Vi ser att lösningarna till ekvationssystemet

$$M_T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ges av

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ -t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

för reella tal  $t$ . En bas för nollrummet till  $T$  ges alltså till exempel av vektorn

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (c) Dimensionen av bildrummet för  $T$  ges av rangen av matrisen  $M_T$ , vilket i sin tur ges av antalet nollskiljda rader i den reducerade trappformen. I detta fall ser vi att dimensionen av bildrummet till  $T$  är lika med 2.
- (d) Vi har att  $P + Q'$ , med  $Q'$  i nollrummet till  $T$  har samma bild som  $T(P)$ . Nollrummet till  $T$  ges som  $[t \ -t \ t]^T$ . T.ex. kan vi välja

$$Q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

**Svar.**

## DEL B

4. Betrakta matrisen

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}.$$

- (a) Bestäm ett egenvärde som har två linjärt oberoende egenvektorer. **(2 p)**  
 (b) Ange alla egenvärden och avgör om matrisen  $A$  är diagonaliserbar. **(2 p)**

**Lösningförslag.**

(a) Matrisen  $A$  har rank 1, uppenbarligen då

$$\begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Det följer att nollrummet har dimension två. Därmed är  $\lambda = 0$  ett egenvärde med två linjärt oberoende egenvektorer.

(b) Det karakteristiska polynomet till  $A$  är

$$0 = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & -5 & -5 \\ -5 & \lambda - 5 & -5 \\ -5 & -5 & \lambda - 5 \end{bmatrix}.$$

Om vi adderar andra och tredje raden till den första erhåller vi

$$\begin{aligned} 0 &= \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & -5 & -5 \\ -5 & \lambda - 5 & -5 \\ -5 & -5 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} \lambda - 15 & \lambda - 15 & \lambda - 15 \\ -5 & \lambda - 5 & -5 \\ -5 & -5 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 15) \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -5 & \lambda - 5 & -5 \\ -5 & -5 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 15) \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 15)\lambda^2. \end{aligned}$$

Och vi har alla nollställen till det karakteristiska polynomet,  $\lambda = 0$  och  $\lambda = 15$ . Dimensionen till deras tillhörande egenrum är lika med den algebraiska multipliciteten (2 och 1, respektivt), och det följer att matrisen är diagonaliserbar.

5. Låt  $V$  vara det linjära höljet till vektorerna  $\begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  och  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ , och låt  $V^\perp$  beteckna dess

ortogonala komplement.

(a) Bestäm en bas för  $V^\perp$ . (2 p)

(b) Låt  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  vara speglingen i  $V$ , dvs  $T(\vec{x}) = \vec{x}$  om  $\vec{x}$  är i  $V$ , och  $T(\vec{x}) = -\vec{x}$

om  $\vec{x}$  är i  $V^\perp$ . Bestäm  $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$ . (2 p)

### Lösningförslag.

(a) Rummet  $V^\perp$  består av alla vektorer  $[x \ y \ z \ w]^T$  som är vinkelräta mot de båda vektorerna  $\vec{v}_1 = [-2 \ -2 \ 0 \ 1]^T$  och  $\vec{v}_2 = [1 \ 0 \ 2 \ 2]^T$ . Skrivet på matrisform betyder det att  $[x \ y \ z \ w]^T$  uppfyller

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Genom radoperationer får vi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{5}{2} \end{bmatrix},$$

så vi ser att lösningarna är

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s - 2t \\ 2s + \frac{5}{2}t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{t}{2} \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

för reella tal  $s$  och  $t$ . En bas för  $V^\perp$  kan alltså väljas som de två vektorerna

$$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad \vec{v}_4 = \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(b) Vi normaliserar vektorerna  $\vec{v}_1$  och  $\vec{v}_2$ , och erhåller en ON-bas för vektorrummet  $V$ ,

$$\vec{n}_1 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad \vec{n}_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Vi låter  $\vec{x} = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$ . Vi har att

$$\begin{aligned} \text{proj}_V(\vec{x}) &= (\vec{n}_1 \cdot \vec{x})\vec{n}_1 + (\vec{n}_2 \cdot \vec{x})\vec{n}_2 \\ &= \frac{1}{3}(-3)\vec{n}_1 + \frac{5}{3}\vec{n}_2 \\ &= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 6+5 \\ 6+0 \\ 0+10 \\ -3+10 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 11 \\ 6 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Detta ger att  $\vec{x} - \text{proj}_V(\vec{x}) = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ . Vi har nu att

$$\begin{aligned} T(\vec{x}) &= T(\text{proj}_V(\vec{x})) + T(\vec{x} - \text{proj}_V(\vec{x})) \\ &= \text{proj}_V(\vec{x}) - \vec{x} + \text{proj}_V(\vec{x}) \\ &= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 11 \\ 6 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} +2 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 13 \\ 3 \\ 11 \\ 5 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(b') *Alternativt:* Vi har en bas  $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$  för  $V$ , och en bas  $\{\vec{v}_3, \vec{v}_4\}$  för  $V^\perp$ . Vi bestämmer koordinatmatrisen för  $\vec{x} = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$  i basen  $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_4\}$ . Detta leder till ett linjärt ekvationssystem, vars totalmatris är

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & -2 & -4 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right].$$

Vi utför elementära radoperationer

$$\sim \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 9 & 3 \\ 0 & 5 & -2 & 0 & 3 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{9} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{5}{9} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} \end{array} \right].$$

Detta ger att

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -\frac{3}{9}\vec{v}_1 + \frac{5}{9}\vec{v}_2 - \frac{1}{9}\vec{v}_3 + \frac{1}{9}\vec{v}_4.$$

Och speciellt har vi att

$$T(\vec{x}) = -\frac{3}{9}\vec{v}_1 + \frac{5}{9}\vec{v}_2 + \frac{1}{9}\vec{v}_3 - \frac{1}{9}\vec{v}_4 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 13 \\ 3 \\ 11 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

**Svar.**

6. Bestäm en symmetrisk matris  $A$  som satisfierar följande.

- (a) Egenrummet tillhörande egenvärdet  $\lambda = 2$  är  $[2t \ t \ -t]^T$ , godtyckliga tal  $t$ .  
 (b) Egenrummet tillhörande egenvärdet  $\lambda = 4$  har dimension två. (4 p)

**Lösningförslag.** Villkoret (a) ger att  $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  är en egenvektor till  $A$  med egenvärdet

2. Vi har från boken att egenvektorer tillhörande olika egenvärden, av en symmetrisk matris är ortogonala. Detta betyder att egenrummet tillhörande egenvärdet 4 är ortogonal till  $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ . Med andra ord att egenrummet  $E_4$  ges av planet  $2x + y - z = 0$ . Vi väljer en ortogonal bas  $\{\vec{u}, \vec{w}\}$  för planet;

$$u := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad w := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Vi behöver inte välja en ortogonal bas, men detta val kommer att göra våra beräkningar nedan enklare. I basen  $\{v, u, w\}$  blir matrisrepresentationen av vår tänkta avbildning lika med

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Den sökta matrisen  $A$  är matrisrepresentationen av avbildningen i standardbasen. Detta betyder att

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

Innan vi börjar bestämma inversmatrisen, noterar vi följande.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Detta ger att den sökta inversmatrisen är följande produkt

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Vi insätter detta i vårt uttryck för matrisen  $A$ , och erhåller att

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \\
&= \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & 2 & \frac{-4}{3} \\ \frac{-1}{3} & 2 & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & \frac{-2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{-2}{3} & \frac{11}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 11 & 1 \\ 2 & 1 & 11 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$



## DEL C

7. Bestäm den räta linje  $L$  som går genom punkten  $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , och som skär de båda linjerna (4 p)

$$L_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 3t \\ t \\ t+1 \end{bmatrix} \mid \text{tal } t \right\} \quad \text{och} \quad L_2 = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ s+4 \\ 2s \end{bmatrix} \mid \text{tal } s \right\}.$$

**Lösningförslag.** Riktningsektorn från punkten  $P$  till en punkt  $Q$  på linjen  $L_1$  är  $Q - P = [3t - 1 \quad t - 1 \quad t]^T$ . Och liknande blir  $[s - 1 \quad s + 3 \quad 2s - 1]^T$  riktningsektor från  $P$  till en punkt på linjen  $L_2$ . För att bestämma  $L$  måste vi bestämma talen  $s$  och  $t$  sådana att vektorerna  $\begin{bmatrix} 3t - 1 \\ t - 1 \\ t \end{bmatrix}$  och  $\begin{bmatrix} s - 1 \\ s + 3 \\ 2s - 1 \end{bmatrix}$  är parallella. Att vektorerna är parallella betyder att det finns  $\lambda$  som löser ekvationssystemet

$$\begin{cases} 3t\lambda - \lambda = s - 1 \\ t\lambda - \lambda = s + 3 \\ t\lambda = 2s - 1. \end{cases}$$

Om vi subtraherar den andra ekvationen från den första, får vi att  $2t\lambda = -4$ . Detta ger  $t\lambda = -2$ . Den tredje ekvationen ger  $-2 = 2s - 1$ , alltså att  $s = \frac{-1}{2}$ . Vi kan använda den andra ekvationen att få  $-2 - \lambda = \frac{-1}{2} + 3$  som ger  $\lambda = \frac{-9}{2}$ . Alltså  $t = \frac{4}{9}$ . Man verifierar att  $\lambda = \frac{-9}{2}$ ,  $t = \frac{4}{9}$  och  $s = \frac{-1}{2}$  också uppfyller den första ekvationen.

Vi konstaterar därmed att  $\begin{bmatrix} s - 1 \\ s + 3 \\ 2s - 1 \end{bmatrix}$ , med  $s = \frac{-1}{2}$ , är en riktningsektor till  $L$ . Denna

vektor har koordinater  $\begin{bmatrix} \frac{-3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ -2 \end{bmatrix}$ , och därför är också  $\begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$  en riktningsektor till  $L$ .

Linjen  $L$  är  $\begin{bmatrix} -3t + 1 \\ 5t + 1 \\ -4t + 1 \end{bmatrix}$ , med godtyckligt tal  $t$ .

**Svar.**

8. Låt  $V_1 \subset V_2 \subset \dots \subset V_n = \mathbb{R}^n$  vara en uppsättning delrum till  $\mathbb{R}^n$  sådana att  $V_k$  har dimension  $k$  för varje  $k$  och  $V_{k-1}$  är ett delrum till  $V_k$  för varje  $k \geq 2$ . En sådan uppsättning delrum kallas en *flagga*. Låt  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  vara en linjär avbildning som *stabiliserar* flaggan. Med det menas att för varje  $k = 1, 2, \dots, n$  och för varje vektor  $v \in \mathbb{R}^n$  gäller implikationen  $v \in V_k \Rightarrow T(v) \in V_k$ . Låt nu  $v_1, v_2, \dots, v_n$  vara vektorer i  $\mathbb{R}^n$  sådana att  $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\} = V_k$  för varje  $k$ . Visa att matrisen för  $T$  med avseende på basen  $v_1, v_2, \dots, v_n$  är övertriangulär. **(4 p)**

**Lösningförslag.** Låt  $B$  vara matrisen för  $T$  med avseende på basen  $v_1, v_2, \dots, v_n$ . För varje  $k = 1, 2, \dots, n$  gäller att  $v_k$  tillhör  $V_k$  eftersom  $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\} = V_k$ . Eftersom  $T$  stabiliserar flaggan följer av detta att även  $T(v_k)$  tillhör  $V_k$ , så  $T(v_k)$  kan skrivas som en linjärkombination  $b_{1,k}v_1 + b_{2,k}v_2 + \dots + b_{k,k}v_k$  av  $v_1, v_2, \dots, v_k$ , där  $b_{1,k}, b_{2,k}, \dots, b_{k,k}$  är reella tal. Med avseende på basen  $v_1, v_2, \dots, v_n$  har  $v_k$  och  $T(v_k)$  koordinatvektorerna

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{respektive} \quad \begin{bmatrix} b_{1,k} \\ b_{2,k} \\ \vdots \\ b_{k,k} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

där den ensamma ettan står på rad  $k$ . Vi drar slutsatsen att

$$B = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \dots & b_{1,n} \\ 0 & b_{2,2} & \dots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & b_{n,n} \end{pmatrix}$$

och alltså är  $B$  övertriangulär.

## 9. Matrisen

$$A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 8 & 0 \\ 5 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

har egenvektorer  $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$  med tillhörande egenvärden

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{7 + \sqrt{57}}{20}, \quad \text{och} \quad \lambda_3 = \frac{7 - \sqrt{57}}{20}.$$

Låt  $X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$  vara en vektor med positiva koefficienter  $a \geq 0, b \geq 0$  och  $c \geq 0$  sådana att  $a + b + c = 1$ . Bestäm punkten  $A^n X$ , när  $n \rightarrow \infty$ . (4 p)

**Lösningförslag.** Vi har tre olika egenvärden, och vet därmed att egenvektorerna  $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ , och  $\vec{x}_3$  bildar en bas för  $\mathbb{R}^3$ . Skriv  $X$  som linjär kombination  $X = \alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \alpha_3 \vec{x}_3$ . Från linjäriteten av  $A^n$  får vi att

$$\begin{aligned} A^n X &= \alpha_1 A^n \vec{x}_1 + \alpha_2 A^n \vec{x}_2 + \alpha_3 A^n \vec{x}_3 \\ &= \alpha_1 \lambda_1^n \vec{x}_1 + \alpha_2 \lambda_2^n \vec{x}_2 + \alpha_3 \lambda_3^n \vec{x}_3. \end{aligned}$$

Vi har att  $|7 + \sqrt{57}| < 20$  och  $|7 - \sqrt{57}| < 20$ . Detta betyder att  $\lambda_2$  och  $\lambda_3$  har belopp äkta mindre än 1, och när  $n \rightarrow \infty$  då vill  $\lambda_2^n \rightarrow 0$  och  $\lambda_3^n \rightarrow 0$ . Detta betyder att  $A^n X \rightarrow \alpha_1 \vec{x}_1$  när  $n \rightarrow \infty$ . Vi vill nu bestämma linjen som egenvektorn  $\vec{x}_1$  spänner upp. Egenvektorn  $\vec{x}_1$  ges av det homogena ekvationssystemet som tillsvarar matrisen

$$A - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} -7 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & -4 \end{bmatrix}.$$

Gauss-Jordan elimination ger

$$\begin{bmatrix} -7 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -7 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 4 \\ 0 & 6 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Med andra ord, egenrummet tillhörande egenvärdet  $\lambda_1 = 1$  är vektorerna  $\begin{bmatrix} \frac{2}{3}t \\ \frac{2}{3}t \\ \frac{2}{3}t \\ t \end{bmatrix}$  med godtyckliga tal  $t$ .

Vi noterar sedan att varje kolumn i matrisen  $A$  summerar till ett. Detta betyder att om vi har en vektor  $X = [a \ b \ c]^T$  där  $a + b + c = 1$ , då vill också koefficienterna till  $AX$  summera till ett;

$$AX = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 3a + b + 4c \\ 2a + 8b \\ 5a + b + 6c \end{bmatrix},$$

och vi har att

$$\frac{1}{10}(3a + b + 4c + 2a + 8b + 5a + b + 6c) = \frac{1}{10}10(a + b + c) = 1.$$

Detta betyder att matrisen  $A$  avbildar planet  $x + y + z = 1$  i sig själv. Vi använder nu dessa två egenskaper vi har kunnat konstatera. Det ena är att  $A^n X$  konvergerar mot linjen  $\text{Span}(\vec{x}_1)$ , och det andra är att koefficienterna till vektorn  $A^n X$  vill vara positiva, och summera till ett.

En punkt på linjen  $\text{Span}(\vec{x}_1)$  är på formen,  $\begin{bmatrix} \frac{2}{3}t \\ \frac{3}{3}t \\ t \end{bmatrix}$ , och kravet att koefficienterna är positiva och summerar till 1 ger att  $t = \frac{3}{7}$ . Vi har visat att vektorn  $A^n X$  vill konvergera mot punkten

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} \end{bmatrix}.$$

---



KTH Teknikvetenskap

**SF1624 Algebra och geometri**  
**Solutions for Examn 2015.06.10**

DEL A

1. We have the following points in three space:

$$A = (-1, 0, 1), B = (1, 1, 2) \quad \text{och} \quad C = (0, 0, 2).$$

- (a) Give a parametric representation of the line  $l$  passing through  $B$  and  $C$ . **(1 p)**
- (b) Determine an equation (normal form) for the plane  $\pi$  containing  $A$ , and orthogonal against  $l$ . **(1 p)**
- (c) Determine the distance between point  $A$  and the line  $l$ . **(2 p)**

**Solution.**

- (a) The line  $l$  passing through  $B$  and  $C$  has directional vector  $\vec{BC} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ . The line passes through e.g. the point  $B$ , which gives the parametric representation

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) As the sought plane is orthogonal  $l$ , the directional vector  $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$  is also a normal vector for the plane. The plane also passes through  $A$ . An equation is then

$$(-1) \cdot (x - (-1)) + (-1) \cdot (y - 0) + 0 \cdot (z - 1) = 0, \quad \text{d.v.s.} \quad x + y + 1 = 0.$$

- (b) We have that  $l$  is orthogonal to the plane  $\pi$ . It follows that the distance we are seeking equals the distance between  $A$  and  $P$ , where  $P$  is the intersection point of  $\pi$  and  $l$ . We have that

$$l \cap \pi = \left\{ \begin{pmatrix} -t+1 \\ -t+1 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ s\u00e5 att } -t+1 - t+1 + 1 = 0 \right\}.$$

It follows that  $t = \frac{3}{2}$ , and that  $P = \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 2 \end{pmatrix}$ . The sought distance is

$$d(A, P) = \|\vec{AP}\| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1} = \sqrt{\frac{3}{2}}.$$

2. For each number  $a$  we have the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2a+2 & -2a-4 \end{bmatrix}.$$

- (a) For which values of  $a$  is the matrix  $A$  invertible? (2 p)  
 (b) Let  $a = 3$ , and determine the inverse of  $A$ . (2 p)

**Solution.**

(a) By adding multiples of the first row to the second and the third, we get

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 2a+2 & -2a-4 \end{bmatrix} &= \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & 2 & -a \\ 0 & 2a & -4 \end{bmatrix} \\ &= 1 \det \begin{bmatrix} 2 & -a \\ 2a & -4 \end{bmatrix} \\ &= 2(-4) - 2a(-a) \\ &= 2(a^2 - 4). \end{aligned}$$

The determinant  $\det(A)$  is therefore zero if and only if  $a = \pm 2$ , so the matrix  $A$  is invertible for all other values of  $a$ .

(b) When  $a = 3$ , we have the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 8 & -10 \end{bmatrix}.$$

Prosecuting elementary row operations give

$$\begin{aligned} \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 8 & -10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & -4 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -5 & -3 & 1 \end{array} \right] \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & -2 & -9/5 & 3/5 \\ 0 & 2 & 0 & -2 & -4/5 & 3/5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3/5 & 1/5 \end{array} \right] \\ &\sim \left[ \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -7/5 & 3/10 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -2/5 & 3/10 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -3/5 & 1/5 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Our candidate for the inverse is

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -7/5 & 3/10 \\ -1 & -2/5 & 3/10 \\ -1 & -3/5 & 2/10 \end{bmatrix}.$$

We control our answer

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 8 & -10 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & -7/5 & 3/10 \\ -1 & -2/5 & 3/10 \\ -1 & -3/5 & 2/10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 - 1 + 3 = 1 & \frac{-7-2+9}{5} = 0 & \frac{3+3-6}{10} = 0 \\ 1 - 1 = 0 & \frac{7-2}{5} = 1 & \frac{-14-16+30}{10} = 0 \\ \frac{3+3-6}{10} = 0 & \frac{-3+3}{10} = 0 & \frac{6+24-20}{10} = 1 \end{bmatrix}.$$

**Answer.**



3. Let  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  be the linear map

$$T(x, y, z) = (x + 2y + z, 2x + y - z, -3x - y + 2z).$$

- (a) Determine a matrix representation of the map  $T$ . **(1 p)**  
 (b) Determine a basis for the kernel,  $\ker(T)$ . **(1 p)**  
 (c) Determine the dimension of the image of  $T$ . **(1 p)**  
 (d) Let  $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ . Determine another point  $Q$  such that  $T(P) = T(Q)$ . **(1 p)**

**Solution.**

(a) We have that

$$T\left(\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x + 2y + z \\ 2x + y - z \\ -3x - y + 2z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

and it follows that the matrix representation of  $T$  is

$$M_T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(b) Gauss-Jordan elimination transforms  $M_T$  to row echolon form

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{bmatrix} &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 5 & 5 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &\sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

We read off the solutions to the system

$$M_T \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

as

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t \\ -t \\ t \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

for real numbers  $t$ . A basis for the kernel is then given by, for instance, the vector

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- (c) The dimension of the image equals the rank of the matrix  $M_T$ , which equals the number of leading ones. In this case the rank is two.
- (d) We have that  $P + Q'$ , with  $Q'$  in the kernel of  $T$  have the same image as  $T(P)$ . The kernel of  $T$  is  $[t \ -t \ t]^T$ . So, we can for instance choose

$$Q = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

**Answer.**

## DEL B

4. We have the matrix

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}.$$

(a) Determine one eigenvalue that has two linearly independent eigenvectors. **(2 p)**

(b) Determine all eigenvalues, and determine wheter the matrix  $A$  is diagonalizable. **(2 p)**

**Solution.**

(a) The matrix  $A$  has rank 1, clearly as

$$\begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \\ 5 & 5 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

So, the kernel is of dimension two. Therefore  $\lambda = 0$  is one eigenvalue having two linearly independent eigenvectors.

(b) The characteristic polynomial of  $A$  is

$$0 = \det(\lambda I - A) = \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & -5 & -5 \\ -5 & \lambda - 5 & -5 \\ -5 & -5 & \lambda - 5 \end{bmatrix}.$$

If we add the second and the third row to the first row, we get

$$\begin{aligned} 0 &= \det \begin{bmatrix} \lambda - 5 & -5 & -5 \\ -5 & \lambda - 5 & -5 \\ -5 & -5 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} \lambda - 15 & \lambda - 15 & \lambda - 15 \\ -5 & \lambda - 5 & -5 \\ -5 & -5 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 15) \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -5 & \lambda - 5 & -5 \\ -5 & -5 & \lambda - 5 \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 15) \det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} \\ &= (\lambda - 15)\lambda^2. \end{aligned}$$

We now know all the roots of the characteristic polyomial,  $\lambda = 0$  and  $\lambda = 15$ . As the dimensions of their corresponding eigenspaces equals their algebraic multiplicities (2 and 1, respectively) we get that the matrix is diagonalizable.

5. Let  $V$  be the linear span of the vectors  $\begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  and  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ , and let  $V^\perp$  denote its orthogonal complement.

(a) Determine a basis for  $V^\perp$ . (2 p)

(b) Let  $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  be the reflection through  $V$ , i.e.  $T(\vec{x}) = \vec{x}$  if  $\vec{x}$  is in  $V$ , and  $T(\vec{x}) =$

$-\vec{x}$  if  $\vec{x}$  is in  $V^\perp$ . Determine  $T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right)$ . (2 p)

**Solution.**

(a) The vector space  $V^\perp$  consists of all vectors  $[x \ y \ z \ w]^T$  that are orthogonal against the two vectors  $\vec{v}_1 = [-2 \ -2 \ 0 \ 1]^T$  and  $\vec{v}_2 = [1 \ 0 \ 2 \ 2]^T$ . Written in matrix form that means that  $[x \ y \ z \ w]^T$  satisfies

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

By elementary row operations we get that

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -\frac{5}{2} \end{bmatrix},$$

and we read off the solutions as

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2s - 2t \\ 2s + \frac{5}{2}t \\ s \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{t}{2} \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

with parameters  $s$  and  $t$ . A basis for  $V^\perp$  can therefore be chosen as the two vectors

$$\vec{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \vec{v}_4 = \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

(b) We normalize the vectors  $\vec{v}_1$  and  $\vec{v}_2$ , and then get an ON-basis for the vector space  $V$ ,

$$\vec{n}_1 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad \vec{n}_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

We let  $\vec{x} = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$ . We have that

$$\begin{aligned} \text{proj}_V(\vec{x}) &= (\vec{n}_1 \cdot \vec{x})\vec{n}_1 + (\vec{n}_2 \cdot \vec{x})\vec{n}_2 \\ &= \frac{1}{3}(-3)\vec{n}_1 + \frac{5}{3}\vec{n}_2 \\ &= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 6+5 \\ 6+0 \\ 0+10 \\ -3+10 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 11 \\ 6 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Then we get that  $\vec{x} - \text{proj}_V(\vec{x}) = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$ . It follows that

$$\begin{aligned} T(\vec{x}) &= T(\text{proj}_V(\vec{x})) + T(\vec{x} - \text{proj}_V(\vec{x})) \\ &= \text{proj}_V(\vec{x}) - \vec{x} + \text{proj}_V(\vec{x}) \\ &= \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 11 \\ 6 \\ 10 \\ 7 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} +2 \\ 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 13 \\ 3 \\ 11 \\ 5 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

(b') *Alternatively:* We have the basis  $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$  for  $V$ , and a basis  $\{\vec{v}_3, \vec{v}_4\}$  for  $V^\perp$ . We determine the coordinate matrix for  $\vec{x} = [1 \ 1 \ 1 \ 1]^T$  with respect to the basis  $\{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_4\}$  of  $\mathbb{R}^4$ . This is given as the solution of the system

$$\left[ \begin{array}{cccc|c} -2 & 1 & -2 & -4 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \end{array} \right].$$

By applying elementary row operations we get

$$\sim \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 2 & 9 & 3 \\ 0 & 5 & -2 & 0 & 3 \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{array} \right] \sim \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{9} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{5}{9} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} \end{array} \right].$$

So,

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -\frac{3}{9}\vec{v}_1 + \frac{5}{9}\vec{v}_2 - \frac{1}{9}\vec{v}_3 + \frac{1}{9}\vec{v}_4.$$

And in particular we get that

$$T(\vec{x}) = -\frac{3}{9}\vec{v}_1 + \frac{5}{9}\vec{v}_2 + \frac{1}{9}\vec{v}_3 - \frac{1}{9}\vec{v}_4 = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 13 \\ 3 \\ 11 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

**Answer.**

6. Determine a symmetric matrix  $A$  that satisfies the following.

- (a) The eigenspace corresponding to the eigenvalue  $\lambda = 2$  is  $[2t \ t \ -t]^T$ , where  $t$  is a parameter.  
 (b) The eigenspace corresponding to the eigenvalue  $\lambda = 4$  has dimension two. **(4 p)**

**Solution.** The first condition (a) gives that  $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$  is an eigenvector with eigenvalue

2. As the matrix  $A$  is symmetric, its different eigenspaces are orthogonal. So, the two dimensional eigenspace corresponding to the eigenvalue 4, is orthogonal to  $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ . In other

words the eigenspace  $E_4$  is given as the plane  $2x + y - z = 0$ . We choose an orthogonal basis  $\{\vec{u}, \vec{w}\}$  for the plane;

$$u := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad w := \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

This is not necessary, but does simplify our calculations that follow. In the basis  $\{v, u, w\}$  the matrix representation of our linear map is the diagonal matrix

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

The matrix we are looking for is the matrix representation in the standard basis. That means that

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

We note, before we continue, that

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

Consequently the sought inverse matrix is given as the following product

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

We now proceed by calculating the matrix  $A$ ,

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \\
&= \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & 2 & \frac{-4}{3} \\ \frac{-1}{3} & 2 & \frac{4}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{8}{3} & \frac{-2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{-2}{3} & \frac{11}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 8 & -2 & 2 \\ -2 & 11 & 1 \\ 2 & 1 & 11 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$



## DEL C

7. Determine the line  $L$  that passes through the point  $P = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ , and intersects both the lines
- (4 p)**

$$L_1 = \left\{ \begin{bmatrix} 3t \\ t \\ t+1 \end{bmatrix} \mid \text{tal } t \right\} \quad \text{and} \quad L_2 = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ s+4 \\ 2s \end{bmatrix} \mid \text{tal } s \right\}.$$

**Solution.** A directional vector from the point  $P$  to a point  $Q$  on the line  $L_1$  is  $Q - P = \begin{bmatrix} 3t-1 \\ t-1 \\ t \end{bmatrix}^T$ . And similarly we get the directional vector  $\begin{bmatrix} s-1 \\ s+3 \\ 2s-1 \end{bmatrix}^T$  from  $P$  to a point on  $L_2$ . We need to determine the numbers  $s$  and  $t$  such that the vectors  $\begin{bmatrix} 3t-1 \\ t-1 \\ t \end{bmatrix}$  och  $\begin{bmatrix} s-1 \\ s+3 \\ 2s-1 \end{bmatrix}$  are parallel. The vectors being parallel means that there exists a number  $\lambda$  solving the system

$$\begin{cases} 3t\lambda - \lambda = s - 1 \\ t\lambda - \lambda = s + 3 \\ t\lambda = 2s - 1. \end{cases}$$

We subtract the second equation from the first, and get that  $2t\lambda = -4$ . So  $t\lambda = -2$ . The third equation gives that  $-2 = 2s - 1$ , so  $s = \frac{-1}{2}$ . We use that information in the second equation  $-2 - \lambda = \frac{-1}{2} + 3$ , and we obtain that  $\lambda = \frac{-9}{2}$ . So  $t = \frac{4}{9}$ . One verifies that  $\lambda = \frac{-9}{2}$ ,  $t = \frac{4}{9}$  and  $s = \frac{-1}{2}$  also satisfies the first equation.

We then have that  $\begin{bmatrix} s-1 \\ s+3 \\ 2s-1 \end{bmatrix}$ , with  $s = \frac{-1}{2}$ , is a directional vector for  $L$ . This vector is  $\begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{5}{2} \\ -2 \end{bmatrix}$ , and then also  $\begin{bmatrix} -3 \\ 5 \\ -4 \end{bmatrix}$  is a directional vector  $L$ .

The line  $L$  is  $\begin{bmatrix} -3t+1 \\ 5t+1 \\ -4t+1 \end{bmatrix}$ , where  $t$  is a parameter.

**Answer.**

8. Let  $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = \mathbb{R}^n$  be a collection of subspaces in  $\mathbb{R}^n$  where  $V_k$  has dimension  $k$  for each  $k$ , and where  $V_{k-1}$  is a subspace in  $V_k$  for each  $k \geq 2$ . Such a collection is called a *flag*. Let  $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  be a linear map that *stabilizes* the flag. That means that for each  $k = 1, 2, \dots, n$  and for each vector  $v \in \mathbb{R}^n$  the implication  $v \in V_k \Rightarrow T(v) \in V_k$  holds. Let  $v_1, v_2, \dots, v_n$  be vectors in  $\mathbb{R}^n$  such that  $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\} = V_k$  for each  $k$ . Show that the matrix representing  $T$  with respect to the basis  $v_1, v_2, \dots, v_n$  is upper triangular. **(4 p)**

**Solution.** Let  $B$  denote the matrix representation of  $T$  with respect to the basis  $v_1, v_2, \dots, v_n$ . For each  $k = 1, 2, \dots, n$  we have that  $v_k$  belongs to  $V_k$ , as  $\text{span}\{v_1, v_2, \dots, v_k\} = V_k$ . As  $T$  stabilizes the flag, we get that even  $T(v_k)$  belongs to  $V_k$ . So  $T(v_k)$  can be written as a linear combination  $b_{1,k}v_1 + b_{2,k}v_2 + \cdots + b_{k,k}v_k$  where  $b_{1,k}, b_{2,k}, \dots, b_{k,k}$  are real numbers. With respect to the basis  $v_1, v_2, \dots, v_n$  we have that  $v_k$  and  $T(v_k)$  have the coordinate vectors

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{respectively} \quad \begin{bmatrix} b_{1,k} \\ b_{2,k} \\ \vdots \\ b_{k,k} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix},$$

where the singleton 1 occurs on row  $k$ . We conclude from this that

$$B = \begin{pmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & \cdots & b_{1,n} \\ 0 & b_{2,2} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & b_{n,n} \end{pmatrix}$$

, which is upper triangular.

## 9. The matrix

$$A = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 2 & 8 & 0 \\ 5 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

has eigenvectors  $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$  with corresponding eigenvalues

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{7 + \sqrt{57}}{20}, \quad \text{och} \quad \lambda_3 = \frac{7 - \sqrt{57}}{20}.$$

Let  $X = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$  be a vector with positive coefficients  $a \geq 0, b \geq 0$  and  $c \geq 0$  such that  $a + b + c = 1$ . Determine the point  $A^n X$ , when  $n \rightarrow \infty$ . (4 p)

**Solution.** We have three different eigenvalues, and know thereby that the eigenvectors  $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ , and  $\vec{x}_3$  form a basis for  $\mathbb{R}^3$ . Write  $X$  as a linear combination  $X = \alpha_1 \vec{x}_1 + \alpha_2 \vec{x}_2 + \alpha_3 \vec{x}_3$ . From the linearity of  $A^n$  we obtain that

$$\begin{aligned} A^n X &= \alpha_1 A^n \vec{x}_1 + \alpha_2 A^n \vec{x}_2 + \alpha_3 A^n \vec{x}_3 \\ &= \alpha_1 \lambda_1^n \vec{x}_1 + \alpha_2 \lambda_2^n \vec{x}_2 + \alpha_3 \lambda_3^n \vec{x}_3. \end{aligned}$$

We have that  $|7 + \sqrt{57}| < 20$  and  $|7 - \sqrt{57}| < 20$ . This means that  $\lambda_2$  and  $\lambda_3$  have absolute values strictly less than 1, and when  $n \rightarrow \infty$  then  $\lambda_2^n \rightarrow 0$  and  $\lambda_3^n \rightarrow 0$ . The implication is that  $A^n X \rightarrow \alpha_1 \vec{x}_1$  when  $n \rightarrow \infty$ . We need now to determine the line spanned by the eigenvector  $\vec{x}_1$ . The eigenvector  $\vec{x}_1$  is one, non-trivial, solution to the homogeneous system given by the matrix

$$A - \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} -7 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & -4 \end{bmatrix}.$$

Gauss-Jordan elimination gives

$$\begin{bmatrix} -7 & 1 & 4 \\ 2 & -2 & 0 \\ 5 & 1 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -7 & 1 & 4 \\ 5 & 1 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 4 \\ 0 & 6 & -4 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

In other words, the eigenspace corresponding to the eigenvalue  $\lambda_1 = 1$  are the vectors

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3}t \\ \frac{3}{3}t \\ t \end{bmatrix} \text{ where } t \text{ is a parameter.}$$

We then note that every column in the matrix  $A$  sum up to one. That implies that if we have a vector  $X = [a \ b \ c]^T$  such that  $a + b + c = 1$ , then also the coefficients of  $AX$  sum up to one;

$$AX = \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 3a + b + 4c \\ 2a + 8b \\ 5a + b + 6c \end{bmatrix},$$

and we have that

$$\frac{1}{10}(3a + b + 4c + 2a + 8b + 5a + b + 6c) = \frac{1}{10}10(a + b + c) = 1.$$

In other words the matrix  $A$  maps the plane  $x + y + z = 1$  onto itself. We use now these two properties: One is that  $A^n X$  converges towards the line  $\text{Span}(\vec{x}_1)$ , and the other property is that the coefficients of  $A^n X$  are positive and sum up to one.

A point on the line  $\text{Span}(\vec{x}_1)$  is of the form  $\begin{bmatrix} \frac{2}{7}t \\ \frac{3}{7}t \\ \frac{3}{7}t \end{bmatrix}$ , and the condition that the coefficients are positive and sum up to one gives that  $t = \frac{3}{7}$ . We therefore get that the vector  $A^n X$  will converge towards

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} \end{bmatrix}.$$

---